



DES CHIRURGIES ESTHÉTIQUES GÉNITALES HOMMESPROCHAINES ÉLÉMENTS À CONSIDÉRER

Op. Dr. Oytun İdil (Estetik plastik cerrahi) / + 90 533 5690649 / oytunmd@gmail.com

Vous pouvez sortir 3 heures après l'opération.
Ne conduisez pas le jour de votre sortie (jour de l'opération).

N'oubliez pas de prendre votre ordonnance à votre sortie.
Cipro 500 mg comprimé, 1 comprimé par jour (une utilisation pendant cinq jours suffit)

Onglet Arvelles, 2 comprimés par jour, un matin et un soir (il n'est pas nécessaire de prendre 2 comprimés tous les jours, vous pouvez les prendre lorsque vous avez des douleurs. Il est recommandé de prendre les antalgiques à jeun et de ne pas dépasser 3 demandeur)

En plus de nos patients qui ont subi une chirurgie d'agrandissement du pénis, Aldactone 100 mg tab. nous écrivons. Ce médicament est administré pour réduire les érections. Vous devriez en prendre 1 par jour. Si une érection se produit la nuit après une chirurgie d'agrandissement du pénis, cette érection provoque des douleurs. C'est pourquoi il est important que vous preniez de l'aldactone. Avec Aldactone, vous ne ressentirez aucune douleur la nuit car l'érection est supprimée pendant le sommeil. Vous dormez bien. L'effet du médicament se produit dans 3-5 jours. N'arrêtez pas d'utiliser Aldactone pendant un jour ou deux simplement parce qu'il n'a aucun effet. Continuez à l'utiliser régulièrement jusqu'à 2 semaines, une fois par jour. Il n'a pas d'effet permanent. Lorsque le médicament est arrêté, son effet de suppression de l'érection disparaît en 3 à 5 jours.

Essayez de protéger votre pansement pendant 3 jours après la chirurgie. Le bout de votre pansement expose le bout du pénis. Vous pouvez donc uriner facilement. Si le pansement glisse vers le gland et recouvre le gland, retirez le pansement. Ne vous douchez pas avant la fin des trois jours. Appliquez la solution de batikon sur les coutures une fois par jour jusqu'à la douche.

Vous pouvez prendre une douche le soir du troisième jour après l'opération. Mouillez votre pansement sous l'eau et retirez-le. Il n'y a aucun mal à se laver avec du savon ou du gel douche sous la douche. Le savon et le gel douche sont déjà considérés comme des désinfectants. A la sortie de la douche, rincer le site opératoire à l'eau claire. A la sortie de la douche, essuyer la zone chirurgicale en appuyant (comprimant) avec une serviette. Si vous comprimez la zone chirurgicale avec une serviette en papier, vous la déshumidifierez complètement.

La piscine ou la mer sont interdites pendant 2 semaines après l'opération. La raison en est que l'eau de la piscine et de la mer ne sont pas stériles et sont considérées comme des microbes. Il est important que vous réduisiez votre consommation de tabac pendant cette période (2 semaines après la chirurgie). Fumer perturbe l'union des lignes de couture. Il peut y avoir des ouvertures dans les coutures.

Vous pouvez voyager en avion tard le soir du jour de votre chirurgie. Si vous devez rentrer dans votre pays immédiatement ce jour-là, votre médecin vous remettra une lettre indiquant que vous pouvez voyager en avion.

Vous pouvez aller travailler le lendemain de la chirurgie.

Après l'opération, les rapports sexuels, les massages sur le pénis, la masturbation, voire le sexe oral sont interdits pendant 3 semaines. Au bout de trois semaines, vous pouvez avoir des rapports sexuels.

Les activités physiques intenses telles que les sports sont interdites dans les 4 semaines suivant la chirurgie. A la fin de la 3ème semaine après la chirurgie, vous pouvez reprendre le sport doucement.

Il n'est pas nécessaire de retirer les fils chirurgicaux. Les points de suture sont des points de suture qui se dissolvent d'eux-mêmes et tombent d'eux-mêmes en trois semaines. La dissolution des points apparaît parfois comme une décharge blanche au niveau des coutures. Cette décharge blanche est la suture qui se dissout elle-même.

Si vous avez la moindre question après l'opération, appelez votre médecin (+90 533 5690649), si vous avez une question sur l'image, envoyez une photo via WhatsApp.

Si une opération a été pratiquée sur les testicules (lifting testiculaire, bande pénoscrotale), le pansement peut se salir légèrement le lendemain de l'opération. L'irrigation sanguine de la peau des testicules est très bonne, il y aura donc des saignements et des suintements le premier jour après l'opération et le pansement peut donc se salir. Dans ce cas, le pansement doit être changé le lendemain. Ceci est tout à fait attendu et naturel.

Il est recommandé aux patients qui ont subi une intervention chirurgicale pour courbure du pénis de ne pas avoir de rapports sexuels pendant 1 mois (4 semaines).

Après la chirurgie, vous pouvez joindre le Dr. Oytun idil des manières suivantes :

+90 533 5690649 (GSM et WhatsApp)

+90 505 2965569 (GSM)

oytunmd@gmail.com

Adresse : Rumeli cad. No:3 D:1 Nisantasi, Sisli
Istanbul Turquie