



Formulaire de consentement éclairé

Op. Dr. Oytun İdil (Estetik plastik cerrahi) / + 90 533 5690649 / oytunmd@gmail.com

INFORMATION DU PATIENT ET FORMULAIRE DE CONSETEMENT CHIRURGIE DE LA CIRCONCISION ET COMPLICATIONS DE LA CIRCONCISION CORRECTION CHIRURGICALE

NOM ET PRÉNOM DU PATIENT :

AGE :

DATE DE L'INFORMATION :

ADRESSE :

Ce formulaire vous informera sur les risques, le déroulement et les résultats de la CHIRURGIE POUR CORRIGER L'ENCEINTE ET LES COMPLICATIONS LIÉES À L'ENCEINTE et vous éclairera sur les traitements alternatifs. Veuillez lire attentivement, signer chaque page et demander à votre médecin si vous avez des questions ou si vous ne comprenez pas certains points.

La circoncision est une intervention chirurgicale mineure pratiquée pour des raisons religieuses et traditionnelles. Elle consiste à enlever le prépuce qui recouvre la tête du pénis. Bien qu'elle soit généralement pratiquée à l'âge de l'enfance, certains patients en font la demande à l'âge adulte. La différence entre les patients adultes et les enfants est que les patients adultes ont une érection.

Par conséquent, dans les cas de circoncision à l'âge adulte, il peut y avoir une ouverture dans les sutures appliquées à la ligne de suture de la circoncision en raison de l'érection après la circoncision. Dans les circoncisions mal réalisées, on peut observer des irrégularités dans la ligne de suture, une perte partielle ou complète de la tête du pénis, des asymétries et des nécroses sur la peau. Ces problèmes sont éliminés par la chirurgie. Le plan de l'opération dépend du type de complication de la circoncision chez le patient.

TRAITEMENT

ALTERNATIF

Il n'y a pas d'alternative à la circoncision. Cette procédure ne peut être réalisée que par voie chirurgicale et avec une technique chirurgicale appropriée. Il n'existe pas de méthode non chirurgicale. Le traitement des complications de la circoncision est également chirurgical. Il n'existe pas de traitement non chirurgical.

AVANT

L'OPÉRATION

L'anesthésiste évaluera le patient avant l'opération. Il l'examine et lui pose des questions. Il effectuera les tests et les examens qu'il juge nécessaires pour éviter tout problème. Informez votre médecin si vous avez une maladie connue ou suspectée (telle qu'une maladie cardiaque, une hypertension artérielle, un diabète), un symptôme ou une allergie (aux médicaments, au matériel médical tel que les sparadraps ou à la nourriture). Décrivez toute opération, procédure ou problème médical antérieur.

ANESTHÉSIE

Cette opération est réalisée sous anesthésie générale. Dans la salle d'opération, le rythme cardiaque et le taux d'oxygène dans le sang du patient sont surveillés en permanence par des appareils électroniques pendant l'opération. Les réactions allergiques ou médicamenteuses aux matériaux utilisés sont rares et peuvent être fatales. De plus, les personnes sensibles à ces substances ne peuvent pas être identifiées à l'avance par des tests de routine. Cependant, lorsque ces conditions indésirables surviennent dans les conditions de l'hôpital, elles peuvent être traitées avec succès et le risque de nuire au patient est extrêmement faible.

DÉROULEMENT

DE

L'OPÉRATION

Avant l'anesthésie générale, le patient ne mangera ni ne boira rien pendant 6 à 8 heures, l'estomac vide. Après l'opération, rien ne sera administré par voie orale pendant au moins 4 à 6 heures. Ces périodes peuvent être modifiées par le médecin du patient. La durée de l'opération est d'une heure à une heure et demie, en fonction de l'intervention à réaliser. Après l'opération, le patient est généralement surveillé dans la salle de réveil pendant une heure, puis renvoyé dans sa chambre. Toutefois, en cas de nausées ou de problèmes similaires dus à l'anesthésie, la durée du séjour peut être prolongée.

RISQUES POSSIBLES LIÉS À L'INTERVENTION CHIRURGICALE

Comme après toute intervention chirurgicale, il peut y avoir des conditions indésirables (complications) après cette opération. Il peut y avoir une infection, un saignement, une asymétrie, une perte de sensibilité, une nécrose. Afin de réduire la probabilité de problèmes, les antibiotiques, les analgésiques et les autres médicaments recommandés par le médecin doivent être utilisés sans interruption après l'opération, et le pansement doit être appliqué régulièrement. En cas de problème lié à l'opération, il convient de consulter en premier lieu le médecin qui a pratiqué l'opération,

car c'est lui qui est le mieux à même d'évaluer l'origine et la solution du problème. Le tabagisme et la consommation de tabac affectent négativement la circulation des tissus et augmentent de manière significative la possibilité de tous les problèmes qui peuvent survenir.

Une infection (inflammation) peut survenir après l'opération. La plupart du temps, elle s'améliore grâce aux pansements et aux médicaments. Toutefois, cela peut entraîner un rétrécissement de la peau et des troubles du contour. Les précautions nécessaires sont prises contre le risque d'infection. Un hématome (accumulation de sang) peut également survenir dans les zones opérées. Afin d'éviter les saignements pendant l'opération, une solution spéciale de réduction des saignements est injectée dans la zone opératoire, puis l'opération commence. Si un hématome se forme, une intervention ultérieure (telle que l'insertion de tubes appelés résistances à travers les trous des canules) peut être nécessaire pour le drainer. Si le saignement est excessif, il peut être nécessaire de procéder à une transfusion sanguine. Après l'opération, il faut s'attendre à des gonflements et des ecchymoses dans les zones concernées. Ils peuvent durer plusieurs semaines.

Un sérome (accumulation de sérum) peut également se produire sur le site de l'opération. Il n'y a pas de risque. Il est généralement absorbé par le corps après un certain temps. Bien que la possibilité soit très faible, une réaction allergique aux médicaments et aux matériaux de suture utilisés peut se développer. Lors de cette intervention, des troubles sensoriels, des fluctuations, des affaissements, des hauteurs, des troubles de la symétrie entre les deux côtés peuvent survenir. Ces troubles peuvent être temporaires ou permanents.

Afin de réduire la probabilité de problèmes, les antibiotiques, les analgésiques et les autres médicaments recommandés par le médecin doivent être utilisés sans interruption après l'opération, et le pansement doit être appliqué régulièrement. En cas de problème lié à l'opération, il convient de consulter en premier lieu le médecin qui a pratiqué l'opération, car c'est lui qui est le mieux à même d'évaluer l'origine et la solution du problème. Le tabagisme et la consommation de tabac affectent négativement la circulation des tissus et augmentent la possibilité de tous les problèmes qui peuvent survenir.

CONSENTEMENT

DU

PATIENT

Mon médecin m'a expliqué mes problèmes, le type de traitement à effectuer, mon intervention chirurgicale, les traitements alternatifs, les risques et les complications que je pourrais rencontrer. Il m'a donné la possibilité de poser toutes les questions que je souhaitais.

Je sais que l'on peut m'administrer du sérum et, si nécessaire, du sang pendant l'opération. Je sais que l'on peut me réopérer sous anesthésie en cas de complications pouvant

nécessiter une intervention chirurgicale. Je sais que si une intervention chirurgicale est nécessaire en raison de complications, je sais que je devrai payer les frais d'hospitalisation liés à ces interventions chirurgicales supplémentaires. Je comprends que des tissus et des organes peuvent être prélevés sur moi pendant l'opération pour enlever l'excès de peau et de tissus mous, pour être utilisés dans une autre région (appelés greffe ou lambeau) ou pour un examen pathologique.

Je comprends que des cicatrices subsisteront après l'opération et qu'elles ne disparaîtront pas à vie. J'accepte de faire ce qui est recommandé (massage avec des crèmes spéciales, application de feuilles de silicone) pour que ces cicatrices restent aussi minimes et aussi bonnes que possible. J'autorise la prise de photos et de vidéos médicales de moi avant, pendant et après l'opération. Je comprends que ces photos et vidéos peuvent être montrées à d'autres médecins à des fins médicales et scientifiques. Je comprends qu'aucune rémunération ne me sera versée pour l'utilisation de ces images et vidéos dans des publications médicales (articles ou livres). Je comprends que l'anesthésie générale comporte des risques, que ceux-ci relèvent de la responsabilité de l'anesthésiste, qu'ils me seront expliqués séparément et qu'un formulaire sera signé.

En conséquence, je comprends que le résultat de cette opération ne m'est pas garanti, qu'il est possible que le résultat escompté ne soit pas atteint pour diverses raisons, et que des résultats encore plus mauvais que la situation actuelle puissent être obtenus. Ce formulaire de consentement peut contenir des erreurs ou des omissions. Si j'ai des questions sur ce formulaire ou sur l'opération, je sais que je peux consulter mon médecin via son adresse électronique (oytunmd@gmail.com), son téléphone portable (+90 533 5690649 et +90 505 2965569) et son whatsapp (+90 533 5690649).

Information sur la pandémie de Covid-19 :
J'ai été informé(e) que les interventions chirurgicales ont été réalisées pendant la pandémie de covid-19 mais en prenant toutes les précautions nécessaires. Malgré toutes ces précautions, sachant que je peux contracter l'infection covid-19 en dehors de l'hôpital, j'accepte d'être opéré(e) en prenant en compte les risques.

A l'issue de celles-ci, j'accepte l'intervention chirurgicale "correction de la circoncision ou des complications de la circoncision" qui m'a été expliquée en détail par mon médecin Op. Dr. Oytun idil avec mon propre consentement et sans aucune influence.

Date : /..... / **2023**

Nom et prénom du patient :

Signature : (veuillez signer en écrivant "J'AI LU, J'AI COMPRIS")

Nom et prénom du parent/témoin :

Le patient a signé le formulaire en ma présence, éveillé et conscient.

Signature :